

Kronhjorten kommer

Onsdagen 28 januari så hade Storfors JVK ordnat med en informationskväll om förvaltning och jakt på kronhjort.

Kronhjorten sprider sig allt mer och vikarierande jaktvårdskonsulent Johan Stedt tryckte hårt på samverkan för att få en bra förvaltning. Hjortarna rör ju sig ofta över stora ytor under året. Det gör ofta att man tror att man har mer kronhjort än vad man egentligen har.

Hjorten kan ha separata vinter-, sommar- och brunstområden.

Vad utmärker kron?

- Ökande stam.
- Svår att inventera och därmed svår att förvalta.
- Känslig för fel avskjutning. Viktigt att spara kapitala hjortar och ledarhindar.
- Känslig för störning och högt jakttryck.

Ska vi få förvaltningen att fungera så är grunden naturligtvis att börja med att sätta upp mål.

Sedan gäller det att inventera hur många vi har, lämpligen genom att räkna vid foderplatser vintertid och på öppna födosöksplatser. Sedan är det dags att göra en plan för tillväxt och avskjutning, och följa den. Det är också viktigt att skjuta rätt djur samt tänka på att hinden bara föder 1 kalv/år.

Några viktiga kännetecken för kronhjortar är att ledarhindarna är viktiga för flocken. Hindar, kalvar, och spetshjortar går ofta i flock. Stora hjortar går för sig själva förutom under brunsten då de har ett harem av hindar. Yngre hjortar bildar herrklubbar.

Vilka hjortar bör skjutas?

Bra inventering är grunden. Andra året kan man se om hjorten har goda anlag eller kan skjutas bort. Bra hjortar utvecklar taggantalet på sina horn till 6-7 års ålder och därefter blir de främst grövre fram till 10-14 år då de har som störst hornkrona.

Bra tips är att skjuta 25% hjort, 35% hind och 40% kalv.

Hur jagar vi på bästa sätt?

Vakjakt och pyrsch har fördelen av lite störningar, ger möjlighet till säkra skott och gör det lättare att välja rätt djur.

Vid hundjakt bör man använda långsamma hundar och köra korta drev. Viktigt att jaga sällan, annars drar lämnar hjortarna lätt området för lång tid.

Folkdrev kräver små såtar. Hjortarna kommer långsamt men det är svårt få ut djuren.

Börja med vakjakt/pyrsch tidigt under säsongen och sedan hund i måttlig mängd

Föda och skador är ofta uppe till debatt. Naturligtvis konkurrerar hjortdjuren med varandra. Ur fodersynpunkt så motsvaras 1 älg = 2 kron = 4 dov = 7 rådjur.

Hjortarna äter gräs och bärris hela året, samt främst bärris och lavar under vintern.

Kan flänga bark. Barkflängning förekommer oftast i närheten av oljevaxter. Är också ojämnt förekommande mellan områden. Kan vara kopplat till störningar på fodersöksplatser.

Störst risk för jordbruksskador i småbruten terräng, men kan avledas genom att man erbjuder alternativt foder och naturligtvis genom att störa dem på otillåtna fodersöksplatser.

Erbjud gärna viltåker med fodermergkål, havre, vete och klövervall. Vintertid går ensilage hem hos kronhjorten liksom toppar från äldre tallar och aspar.

Vi fick en intressant kväll med mycket bra informationer som genererade intressanta frågor och diskussioner. Stort tack till Storfors JVK som arrangerade mötet.